

## Erntetermine

### Situation

Die diesjährige Kernobsternte wird gemäss Berechnungen ähnlich wie letztes Jahr erwartet. Aufgrund der gemeldeten T-Stadien ergeben sich die aufgeführten mittleren Erntetermine. Je nach Region, Exposition (Nord-/Südhang), Unterlage, Behang und Boden verschieben sich die Termine pro 25 Höhenmeter um ungefähr 1 bis 2 Tage.

### Ernte Tafeläpfel 450 m.ü.M. (berechnet für die Kantone Aargau, Luzern, Zug)

Tafeläpfel	Erntebeginn	Haupternte
Galmac	30. Juli	4. August
Gravensteiner	5. August	10. August
Summerred	7. August	12. August
Primrouge	11. August	16. August
Cox Orange	24. August	29. August
Rubinola	26. August	31. August
Elstar Elshof	28. August	3. September
Gala	30. August	4. September
Elstar Standart	2. September	7. September
Arlet	3. September	8. September
Spartan	5. September	10. September
Ladina	7. September	12. September
Greenstar	8. September	13. September
Diwa (Milwa)	9. September	20. September
Jonagold	14. September	19. September
RubINETTE	13. September	18. September
Ariwa	14. September	19. September
Boskoop	14. September	19. September
Golden Del.	17. September	22. September
Topaz	17. September	22. September
Mairac	15. September	20. September
Glockenapfel	19. September	24. September
Idared	21. September	26. September
Pinova	24. September	29. September
Kanzi	26. September	1. Oktober

<b>Otava</b>	<b>28. September</b>	<b>3. Oktober</b>
<b>Maigold</b>	<b>28. September</b>	<b>3. Oktober</b>
<b>Iduna</b>	<b>29. September</b>	<b>4. Oktober</b>
<b>Bonita</b>	<b>29. September</b>	<b>4. Oktober</b>
<b>Braeburn Marired</b>	<b>10. Oktober</b>	<b>15. Oktober</b>

Die definitiven Erntetermine ermitteln Sie für den eigenen Betrieb anhand der **Erntekriterien** wie Aufhellung der Grund- und Deckfarbe, Ausbildung der Kelchgrube & der Lentizellen, Stiellöslichkeit, Geschmack und **mittels Streif-Index** (Zuckergehalt, Festigkeit, Stärkeabbau).

Der Pflücktermin ist zudem zwingend **auf die Lager- bzw. Verkaufsart der Früchte abzustimmen** (Frischkonsum, Kühllager, Kurz- oder Langzeitlagerung im CA oder ULO, SmartFresh, ...). **Den definitiven Pflücktermin deshalb frühzeitig mit dem jeweiligen Handelsbetrieb absprechen.**

Bei tropfenden Sorten wie z.B. Boskoop können Anwendungen von Amid oder Essigsäure gegen vorzeitigen Fruchtfall sinnvoll sein.

### **Haupternte Tafelbirnen (berechnet für die Kantone Aargau, Luzern, Zug)**

In frühen, exponierten Lagen um 400 m.ü.M. kann die Ernte auch schon 4-5 Tage früher starten

<b>Sorte</b>	<b>450 m.ü.M.</b>	<b>500 m.ü.M.</b>
<b>Williams</b>	<b>10. August</b>	<b>13. August</b>
<b>Conférence</b>	<b>24. August</b>	<b>27. August</b>
<b>Gute Luise</b>	<b>1. September</b>	<b>4. September</b>
<b>Packhams</b>	<b>5. September</b>	<b>8. September</b>
<b>Kaiser Alexander</b>	<b>8. September</b>	<b>11. September</b>

**Wichtig:** Der definitive Pflücktermin bei den Lagerbirnen richtet sich wie in den letzten Jahren nach dem Reifeindex. **Dieser Erntetermin ist mit dem zuständigen Lagerhalter unbedingt abzusprechen und zwingend auf die Lager- bzw. Verkaufsart der Früchte abzustimmen.**

Bei der Sorte Kaiser Alexander ist bei diesem Pflücktermin eine Behandlung mit Dirager Plus gegen vorzeitigen Fruchtfall zu machen.