

Biodiversitätsförderflächen (BFF)

Unkraut	Wirkstoffe ①	Mittel ①	Text Nr.W. . .	PSA	Formulierung	Firma	SPe2; S2 (inkl. Sh)	SPe3 (A) in Punkten	Dosierung %	Fr./I Mittel	Anwendung in:		
											Extensive Wiesen/Weiden	Wenig intensive Wiesen	Wiesenstreifen entlang von Hecken und Feldgehöften ③
Ambrosia	Florasulam	④	Primus	◆ SC	Ba			0,03%	166.–/0,25l			✓	✓
Blacken	Fluroxypyr+ Aminopyralid	6	Simplex*	◆ ME	Om LG	S2	0,5%	110.–	✓	✓	✓	✓	✓
	Metsulfuron	13	Ally Tabs	◆ TB	St		1 Tabl./1 l	4.–/Tabl.	✓	✓	✓	✓	✓
	Glyphosate	7	diverse Mittel	◆ SL	div.		5–10%	14–24.–	✓	✓	✓	✓	✓
	Triclopyr + Clopyralid	18	Picobello	◆ EC	Om	S2	0,5–1%	101.–	✓	✓	✓	✓	✓
	Triclopyr + Fluroxypyr	19	Garlon 2000	◆ ME	St	S2	2%	48.–	✓	✓	✓	✓	✓
Brombeeren	Fluroxypyr+ Aminopyralid	6	Simplex*	◆ ME	Om LG	S2	1%	110.–	✓	✓	✓		
	Triclopyr + Clopyralid	18	Picobello	◆ EC	Om	S2	0,5%	101.–	✓	✓	✓		
	Triclopyr + Fluroxypyr	19	Garlon 2000	◆ ME	St	S2	2%	48.–	✓	✓	✓		
Disteln	Fluroxypyr+ Aminopyralid	6	Simplex*	◆ ME	Om LG	S2	1%	110.–	✓	✓	✓	✓	✓
	Clopyralid+ Rapsöl	4	Alopex+	◆ SG	Om		0,04%	80.–/150 g	✓	✓	✓	✓	✓
	Clopyralid + Öl	4	Telmion	◆ EC	Om		0,2%	12.–/11	✓	✓	✓	✓	✓
			Lontrel 100 Ⓡ	◆ SL	Sy		0,3%+	60.–	✓	✓	✓	✓	✓
	Glyphosate	7	+ Etafix Pro diverse Mittel	◆ SL	Sy		0,05%	14–24.–	✓	✓	✓	✓	✓
	Triclopyr + Clopyralid	18	Picobello	◆ EC	Om	S2	5–10%	101.–	✓	✓	✓	✓	✓
	Triclopyr + Fluroxypyr	19	Garlon 2000	◆ ME	St	S2	0,25–0,5%	48.–	✓	✓	✓	✓	✓
Herbstzeitlosen	Metsulfuron	13	Ally Tabs	◆ TB	St		1 Tabl./l	4.–/Tabl.	✓	✓	✓		
Japan. Knöterich	Fluroxypyr + Aminopyralid	6	Simplex*	◆ ME	Om LG	S2	1%	110.–	✓	✓	✓	✓	✓
Kreuzkräuter	Metsulfuron	13	Ally Tabs	◆ TB	St		1 Tabl./l	4.–/Tabl.	✓	✓	✓		
	Fluroxypyr + Aminopyralid	6	Simplex*	◆ ME	Om LG	S2	1%	110.–	✓	✓	✓	✓	✓
Winden	Glyphosate	7	diverse Mittel	◆ SL	div.		5–10%	14–24.–				✓	✓
Quecken	Fluazifop-butyl	②	Fusilade Max	◆ EC	Sy		1%	32.–				✓	✓
	Quizalofop	②	Targa Super	◆ EC	Ba		1%	64.–				✓	✓
	Glyphosate	7	diverse Mittel	◆ SL	div.		5–10%	14–24.–				✓	✓

✓ Bewilligt

① Alle Mittel: Nur Einzelpflanzenbehandlung. Glyphosate (diverse Mittel) und Ally Tabs empfohlen mit Handspritzgeräten (z. B. Sobidoss, Rodoss usw.), übrige Mittel mit Rückenspritzen.

② Text siehe G3, G5, Seite 105.

③ In einem 3 Meter breiten Streifen entlang von Oberflächengewässern ist der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verboten.

④ Text siehe Getreideherbizid G13, Seite 61.

Ⓐ Aufbrauchfrist: 30.11.2024

* SPe1: nur 1 x in 2 Jahren auf derselben Fläche anwenden.

SPe3 (A) Abschwemmauflage: nötige Punkte zur Reduktion der Abschwemmung (Seite 112)

Hinweis: Alle übrigen in Wiesen bewilligten Herbizide dürfen in den Biodiversitätsförderflächen (BFF) nicht eingesetzt werden.